A Bosioschtól Orsováig tartó dunavidék kevés ásványi kincset rejt ugyan, az Eibenthal, vagy Tissovicza falu melletti vidéket kivévén, de annál figyelemre méltóbb a földbuvár (geognosta) s füvészre nézve. — Itt több helyen kőszén mutatkozik és ásatik is; de tetemes mennyiségü vaskovond tartalma miatt csekélyebb becsü a többi bánságinál. —

A hegyfaj áll csillám- és agyagpala, fövény-, mondola, és mészkőből, különböző szinezetü márványból, kigyla is ugyan bőven találtatik, de uralkodó a mészkő. — A növényzet az egész bánságban feltünőleg különböző. — Bosioschtól Orsováig örőm dagasztja a vándor füvész keblét, lelvén itt több ritka növényeket mint például: a bánsági bazsál — (poeonia banatica) kereklevelü kőrisfa — (fraxinus rotundifolia) bibircsós kecskerágó (evonymus verrucosus), — és többeket. — Reménylem, hogy fáradhatatlan szorgalmú füvészünk, Wierzbicky bányaorvos úr e tárgyról többet szóland. — Részemről e vidéket a növénytan kedvellőinek méltán ajánlhatom. — A hozzám legközelebbi környék torlasztott hegyeiben, tiz ölnyi mélységig, növénylenyomatok, szenesült növényrészek, elmállott és kövült kagylók nagy számmal találtatnak, s ha kivántatik, az azokboli gyüjtemény felállitására tellyes készséggel ajánlom magamat. —

Örömemre fog szolgálni, ha ezen rövid közlésem által nem épen érdektelen tárgyakat legalább megemlitheték. —

Caricineae

in Regnis Hungariae, Slavoniae, Croatiae nec non magno Transylvaniae Principatu sponte nascentes enumeratae ac digestae

a Joanne Heuffel Medicinae Doct.

Carices Hungariae a lustris quinque objectum excursionum mearum botancarum praecipium et dum vacabat investigationum fuere; peragravi idcirco magnam Hungariae partem, a lacu Peisonis usque altissima Carpatorum Scepusii cacumina et hinc meridiem versus usque Tibisci Danubiique oras, et cum ante annos sedecim specimen inaugurale mihi dandum fuisset, Caricum hungaricarum Monographiam scripturus eram; at tempora et circumstantiae laborem diferre jubebant, quod quidem nunc non doleo; ab eo enim tempore fato ad ultimas versus Valachiam oras delatus, hic rarissimarum stirpium novam detexi patriam. Ex repetitis praeterea investigationibus mihi persuasum est, Caricis genus quoad fructus fabricam homogeneas utcunque complecti species, quoad vero inflorescentiam, sexus dispositionem, stigmatum numerum, organorum in fructu quorundam praesentiam aut absentiam diversissima comprehendere vegetabilia; ita ut eodem fere jure singulae plantarum familiae uno conprehenderentur genere; cum praeterea novissimis detectis genus hocce specierum numero in infinitum ditatum fuerit, conatus sum id naturali quodam modo in genera plura, aut si mavis sectiones subdividere, speciesque ex affinitate dislocare; do tamen hic laborem ad patriae species restrictum, ut eum ex Caricologia Hungariae mox typis excudenda, extraxi, alienigenarum schema relinquens iis, qui ingenio, tempore, bibliothecis, museis et hortis botanicis adjuti, huic labori pares sunt. Meis autem conatibus, etsi exiles et mancos eos judicaveris, fave L. B. utroque si videbitur.

Maukschia *)

Spica solitaria dioica aut rarius androgyna; perigynia plus minus elongata, plano-convexa aut obsolete trigona, demum patula. Stigm. 2. Arista ad nucis basim nulla.

*) R. D. Mauksch Pastor condam Schlagendorfensium in Scepusio, relictis curis pastoralibus, Kesmarkini scientiis solum vivens, locupletissimum Scepusii herbarium, annotationibus acutissimis instructum Cel. Wahlenberg. anno 1813, mihique 1827. in Carices Hungariae indaganti benevole aperuit.

Digitized by Google

1. M. laevis. Carex laevis Hopp. exs. Cent. 3. C. dioica Linn. Spec. II pag. 1379. C. Linnaei Degl. in Locol. Gall. II. pag. 687. C. Linnaeana Host Gram. III. p. 51. T. 77. Vignea dioica Reichenb. excurs. n. 376.

3. M. scabra. Carex scabra Hopp. exs. Cent. 3. C. dioica Host. Gram. I. p. 32. T. 41. C. Davalliana Smith Britt. III. p. 964. Vignea Davalliana Reichenb. excurs. n. 377.

Psyllophora.

Spica solitaria androgyna, basi feminea; valvae persistentes; perigynia oblonga, subteretia aut obsolete trigona, utrinque attenuata, demum reflexa. Stigm. 2. Rudimento rhacheolae aut arista ad nucis basim minuta.

Ps. vulgaris. C. pulicaris Linn. Spec. II. p. 1380. C. psyllophora Linn. Suppl. p. 413. Vignea pulicaris Reichenb. excurs. n. 378.

Leucoglochin.

Spica solitaria androgyna, basi feminea; valvae caducae; perigynia teretia, elongata, subulata, demum reflexa. Stigm. 3. Arista ad nucis basim nulla.

L. pauciflorus. Carex Leucoglochin Ehrn. Bajt. I. p. 186. C. pauciflora Lightf. Scot. p. 543. —

Callistachys.

Spica solitaria multiflora, androgyna, basi feminea; valvae subcaducae; perigynia oblonga, trigona utrinque stipitata, demum reflexa. Stigm. 3. Seta ad nucis basim nulla.

C. pyrenaica. Carea pyrenaica Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 139

Genersichia*)

Spica solitaria pauciflora, androgyna basi feminea; valvae persistentes; perigynia ovato-subglobosa obsolete trigona, patula Stigm. 3. Rhacheola ad nucis basim filiformis biloba.

G. obtusata. Carex obtusata Liljebl. Act. Holm. 1793. p. 69. T. 4. C. spicata Schk. Car. p. 11. n. 5.?

Cryptoglochin.

Spica composita spiculis in capitulum aggregatis, androgynis, superne masculis; perigynia subtriquetra, setam subulatam, apice trilobulatam, e basi nucis emergentem includentia. Stigm. 3.

C. curvulus. Carex curvula Alt. Ped. n. 2295 T. 92. f. 3.

Schelhammeria Moench.

Spiculae arcte capitato-aggregatae involucratae, basi masculae; valvae superiores comosae; perigynia lanceolata; pedicellata, longissime rostrata. Stigm. 2. Seta ad nucis basim nulla.

Sch. capitata Moench. Suppl. p. 119. Carex cypiroides Linn. Syst. Veg. p. 703. C. bohemica Schreb. Gram. II. p. 52. T. 28. f. 3.

---

*) Samuel Genersich M. D. Civitatis L. R. Leutsoviensis Physicus scripsit Enumerationem et Catalogum Plantarum Scepusii.

Digitized by Google

Vignea Pal. Beauv.

Spicae compositae aut decompositae; spiculae in rhachi aut ramulis sessiles, alternae aut sparsae, androgynae; perigynia plano — aut gibboso- convexa. Stigm. 2. Seta ad nucis basim nulla.

Sect. I. Stellutatae: Spicae compositae spiculae basi masculae; perigynia plano- convexa, rostrata, patentia aut stellulatim divergentia.

1. V. stellulata Reichenb excurs. n. 389. Carex stellulata Good. in Linn. Trans. II. p. 144. C. Lecrvii Willd. Prodr. n. 95.

2. V. Grypos Reichenb. excurs n. 384. Carex Grypos Schk. Car. II. 18. f. 193. C. pellulata β.) leptophylla Heuff. herb.

Sect. II. Vulpinoideae: spicae compositae aut decompositae, spiculae apice masculae; perignynia plano-convexa, rostrata, patentia aut divergentia.

3. V. divulsa Reichenb. excurs. n. 406. Carex divulsa Good. in Linn. Trans. II. p. 160. C. nemorosa Lumn. Poson. p. 418.

4. V. muricata Reichenb. excurs. n. 390. Carex muricata Linn. Spec. II. p. 1382.

β.) virens Reichenb. excurs. n 391. Carex virens Lam. Dict. III. p. 384. C. nemorosa Host. Gram. IV. T. 81.

γ.) contigua Hopp. in Sturm. Car. VI. n. 2.

5. V. vulpina Reichenb. excurs. n. 408. Carex vulpina Linn. Spec. II. p. 1382.

β.) nemorosa Reichenb. excurs. n. 497. Carex nemorosa Willd. Spec. IV. p. 232. C. aristata Kit. herb.

Sect. III. Chordorrhizae: spica composita spiculis in capitulum laxum aggregatis, superne masc.; perigynia imbricata, plano convexa, in rostrum plus minus cariosum bilobum aut bidentatum attenuata.

6. V. chordorrhiza Reichenb. excurs. n. 383. Carex chordorrhiza Ehrh. in Linn. Suppl. p. 414.

7. V. stenophylla Reichenb. excurs. n. 382. Carex stenophylla Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 142. C. arenaria Lumn. Poson. n. 919 excl. diagn. et syn. fide specim. C. juncifolia Schk. Car. p. 26. n. 18. C. glomerata Host. Gram. I. p. 32. T. 44.

8. V. divisa Reichenb. excurs. n. 398. Carex divisa Huds. Angl. p. 405.

β.) rivularis Schk. Car. f. 87.

9. V. schoenoides. Carex schoenoides Host. Gram. I. p. 35. T. 45.

Sect. IV. Arenariae: spica decomposita spiculis spicato-congestis, masc. et fem. plerumque androgynis intermixtae; perigynia plano-convexa, nervosa, marginata, marginibus serrulato-scabra, in rostrum bidentatum adtenuata.

10. V. intermedia Reichenb. excurs. n. 403. Carex intermedia Good. in Linn. Trans. II. p. 154. disticha Huds. Angl. p. 403.

11. V. arenaria Reichenb. excurs. n. 405. Carex arenaria Linn. Spec. II. p. 1381.

Sect. V. Paniculatae: Spica composita vel paniculata, spiculis superne masc; perigynia ovata, gibboso-convexa, laevia; rostrum bidentatum marginibus serrulato-scabrum.

12. V. paradoxa Reichenb. excurs. n. 410. Carex paradoxa Willd. Act. Ac. Berol. 1794. p. 39. T. 1. f. 1. C. canescens Host. Gram. I. p. 43. T. 57.

13. V. paniculata Reichenb. excurs n. 411. Carex paniculata Linn. Spec. II. p. 1383. C. subramosa Kit. herb.

14. V. teretiuscula Reichenb. excurs. n. 409. Carex teretiuscula Good. in Linn. Trans. II. p. 163.

Sect. VI. Heleonastes: Spica composita, spiculis serie simplici alternatim dispositis, inferne masc., rarissime inferiores masc. fem. — Perigynia plano-convexa, nervosa, glabra, in rostrum breve ore integrum aut leviter emarginatum glabriusculum attenuata.

15. V. elongata Reichenb. excurs. n. 394. C. elongata Linn. Spec. II, p. 1383.

16. V. canescens Reichenb. excurs. n. 394. Carex canescens Linn. Succ. n. 842. C. curta Good. in Linn. Trans. II. p. 145.

*

Digitized by Google

17. V. lagopina Reichenb. excurs. n. 386. Carex lagopina Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 145. C. leporina Linn. Lapp. n. 322. C. approximata Hopp. exs. Cent. 3.

Sect. VII. Ovales: Spica composita serie simplici alternatim dispositis, inferne masc. — Perigynia plano-convexa, nervosa, angulis marginato subalata, in rostrum bidentatum marginibus serrulato-scabrum attenuata.

a.) Radix fibrosa, caespitosa.

18. V. leporina Reichenb. excurs. n. 396. Carex leporina Linn. Spec. II. p. 1381. C. ovalis Good. in Linn. Trans. II. p. 148.

b.) Radix repens.

19. V. brizoides Reichenb. excurs. n. 392. Carex brizoides Linn. Spec. II. p. 1381.

20. V. Schreberi Reichenb. excurs. n. 379. Carex praecox Schreb. Spic. p. 63. C. Schreber. Schrank Bay. Flor. I. p. 278.

Sect. VIII. Axillares: Spica composita spiculis alternis, inferne masc., inferioribus remotissimis, bractea foliacea longa suffultis; perigynia plano-convexa, compressa, superne marginata, in rostrum ore bidentatum, marginibus serrulato-scabrum acuminata.

21. V. remota Reichenb. excurs. n. 399. Carex remota Linn. Spec. II. p. 1383.

Carex Linn.

Spicae monoicae plerumque, subsessiles aut pedunculatae, suprema una plures masculae aut androgynae, reliquae femineae. Stygm. 3 rarius 2. seta ad nucis basim nulla.

I. Caricis verae: Stigm. 3.

* Spicae plures, terminalis androgyna, basi masc.
reliquae fem. aut omnes androgynae.

Sect. I. Atratae: Perigynia erostrata vel rostro brevi tereti truncato, oblique abscisso aut leviter bidentato.

1. C. atrata Linn. Spec. II. p. 1386.

2. C. aterrima Hopp. Car. n. 52.

3. C. Buxbaumii Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 164.

Sect. II. Fuliginosae: Perigynia oblonga, membranaceo-marginata, rostrata; rostro longo, ore submembranaceo, bicuspidato.

4. C. fuliginosa Sternb. et Hopp. Denkschr. 1816. p. 163. C. frigida Host. Gram. IV. p. 50. T. 90. C. proboscidea Kit. herb. C. magellanica Bot. Scepusii ante Wahlenb.

** Spicae plures, terminalis mascula
una — plures, reliquae femineae.
A. spica terminalis masc. solitaria.

Sect. III. Ferrugineae: Spicae plures, terminalis masc. solitaria, rarius 2; fem. 2 — plerumque longe pedunculatae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia oblonga, nervosa, rostrata; rostrum marginatum, serrulato-ciliatum, antice planum, ore membranaceo-bilobum aut bidentatum.

a) Radix fibrosa.

5. C. ferrugina Schk. Car. I. p. 92. C. sempervirens Vill. Delph. II. p. 214. C. spadicea Baumg. Trans. III. p. 308 excl. Schk. et All. syn. C. varia Host. Gram. I. p. 59. T. 80. C. carpatica Kit. herb. C. firma, β.) subalpina Wahlenb. Carp. n. 961.

6. C. laevis Kit. in Willd. Spec. IV. p. 292.

7. C. firma Host Synops. p. 509. C. pygmaea Kit. herb.

b.) Radix stolonifera.

8. C. Mielichhoferi Schk. Car. II. p. 66. C. ferruginea Scop. Carn. II. p. 225.

Sect. IV. Psilostachyae Spicae fem. 2—4, plerumque longe pedunculatae pendulae bracteae vaginantes foliacae; perigynia trigona nervosa, laevissima, rostrum marginatun glabrum bidentatum bifidumve.

9. C. brachystachys Schrank Bay. Flor. I. p. 294. C. tenuis Host. Gram. IV. p. 51. T. 92. C. compressa Kit. in Villd. Spec. IV. p. 276.

Digitized by Google

10. C. sylvatica Huds. Angl. I. p. 353. C. Drymeja Ehrh. Beytr. II. p. 139. C. psilostachya Kit. in Willd. Spec. IV. p. 289.

Scit. V. Leptostachyae: Spicae sim. 2—6, plerumque longe pedunculatae, pendulae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia trigona; glabra; rostrum breve ore truncatum aut leviter emarginatum. —

11. C. strigosa Huds. Ang. p. 411. C. Liptostachys Ehrh. Phys. n. 48. C. patula Lumn. Poson. n. 945. descriptio excl. dragn. et Syn.

12. C. maxima Scop. Carn. II. p. 229. C. Agastachys Linn. fil. Suppl. p. 414. C. pendula Linn. Trans. II. p. 168.

Good. in13. C. capillaris Linn. Spec. II. p. 1386.

Sect. VI. Limosae: Spicae fem. 2—3, longe pedunculatae cernuae aut pendulae; bracteae subfoliaceae amplectentes aut brevissime vaginantes; perigynia subrotundo-ovata, lenticulari-compressa, rostello minuto, tereti, truncato.

14. C. limosa Linn. Spect. II. p. 1386.

Sect. VII. Nitidae: Spicae fem. 1—2, breviter pedunculatae, erectae vaginantes aphyllae aut foliaceo — mucronatae; perigynia globoso-ovata, striata, glabra nitidaque; rostrum teres, ore membranaceum oblique truncatum aut bilobum.

15. C alba Scop. Carn. II. p. 216.

16. C. nitida Host Gram. I. p. 53. T. 71. C. verna Schk. Car. p. 89. C. conglobata Kit. in Willd. Spec. IV. p. 281. C. semicylindrica Kit. herb.

17. C. supina Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 158. C. campestris Host Gram. IV. p. 49. T. 88. C. glomerata Schk. Car. I. p. 79. C. pusilla Kit. herb.

Sect. VIII. Lasiocarpa: Spicae fem. 1—3. sessiles aut infima pedunculata; bracteae amplectentes aut breviter vaginantes, membranaceae aut foliaceo mucronatae: perigynia pubescentia aut tomentosa, obovato-trigona; rostrum breve ore truncatum aut leviter emarginatum.

a.) Radia fibrosa.

18. C. montana Linn. Suec II. n. 845. C. collina Willd. Spec. IV. p. 260. C. emarginata Kit. in Willd spec. IV. p. 262.

β.) Coarctata Kit. herb.

19. C. pilulifera Linn Spec. II. p. 1385.

20. C. gynobasis Vill. Delph. II. p. 206. C. alpestris All. Ped. n. 2329. C. diversiflora Host. Gram. I. p. 53. T. 70.

b.) Radix stolonifera.

21. C. ericetorum Poll. Palat. II. p. 886. C. ciliata Willd. Spec. IV. p. 261

22. C. praecox Jacq. Austr. V. p. 23. T. 446.. C. ericetorum Lumn. Poson. n. 932 non Poll. C. truncatula Kit. herb.

β.) umbrosa Host Gram. I. p. 52. T. 69.

ν.) rhizostachya Lois. Gall. II. p. 309.

δ.) pyriformis Láng herb.

23. C. trachyantha Dorn. in litt.

24. C. tomentosa Linn. maut p. 123. C. filiformis Lum. Poson. n. 933. non Linn.

β. angustifolia Kit. herb.

Sect. IX. Ornithopodae: Spicae fem. 1—3, pedunculatae, erectae; bracteae vaginantes aphyllae; perigynia pubescentia, obovato — trigona; rostrum brevissimum ore emarginatum.

25. C. humilis Leys. Hall. p. 175. clandestina Good. in Linn. Trans. II. p. 167.

26. C. ornithopoda Willd. Spec. IV. b. 255.

27. C. digitata Linn. Spec. II. p. 1384.

Sect X. Miliaceae: Spicae fem. 2—3, densiflorae, pedunculatae, cernuae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia elliptico-oblonga, obtusa erostrata.

28. C. pallescens Linn. Spec. II. p. 1386.

Sect. XI. Laxiflorae: Spicae fem 2—4, pedunculatae, laxiflorae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia subgloboso-ovata rostrata; rostrum teres oblique truncatum.

29. C. panicea Linn. Spec. II. p. 1387.

Digitized by Google

30. C. pilosa Scop. Carn. n. 1162.

Sect. XII. Oligocarpae: Spicae fem. 1—2, laxiflorae, breviter pedunculatae, erectae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia obovata, ventricoso-trigona, in rostrum bidentatun, aut bifidum, serrulato-scabrum subito acuminata.

31. C. depauperata Good in Linn. Trans. II. p. 181.

32. C. Michelii Host. Synops. p. 507.

33. C. brevicollis Lam. et Cand. Flor. Franc. IV. p. 295. C. rhynchocarpa Heuff. Flor. 1833. p. 364. specimen juvenile. C. bifida Kit. herb.

β.) puberula Heuff. herb.

Sect. XIII. Flavae: Spicae fem. 2—3, approximatae subsessiles; bracteae vaginantes foliaceae, patentes perigynia subrotundo-ovata, inflata, in rostrum antice planum, margine serrulato-scabrum ore bidentatum acuminata.

34. C. flava Linn. Spec. II. p. 1384.

β.) polystachya Gocd. Helv. VI. p. 97.

35. C. Oederi Ehrh. Calam. n 79.

β.) polystachia Heuffl. herb.

Sect. XIV. Distantes: Spicae fem. 2—4, omnes aut saltem infima remotae, bracteae vaginantes foliaceae, erectae; perigynia ovata, subinfluata, in rostrum antice planum marginibus serrulato-scabrum, bidentatun aut bifidum acuminata. Ligula oppositifolia.

36. C. fulva Good. in Linn. Trans. II. p. 177.

37. C. Hornschuchiana Hopp. Car. Germ. p. 76.

38. C. flavescens Host Gram. IV. p. 53. T. 96.

39. C. distans Linn. Spec II. p. 1387.

40. C. binervis Smith in Linn. Trans. V. p. 286.

41. C. extensa Good in Linn. Trans. II. p. 175.

B. Spicae terminales masc. 2—3.

a.) Perigynia glabra.

Sect. XV. Secalinae. Spicae fem. 3.subsessiles; bracteae vaginantes foliaceae, erectae; perigynia plano-convexa, in rostrum acute bifidum, marginatum, ciliato-serratum, antice planum acuminata.

42. C. secalina Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 151.

Sect. XVI. Flaccae: Spicae masc. subbinae fem. 2—3. pedunculatae cernuae; bracteae breviter vaginantes foliaceae; perigynia elliptico-oblonga, compresso-convexa, scabriuscula; rostellum brevissimum ore truncatum aut subemarginatum.

43. C. glauca Scop. Carn. II. p. 223. C. flacca Schub. Spic. app. p. 150. C. recurva Good. in Linn. Trans. II. p. 184.

β.) alpina Heuff. herb.

γ.) transylvanica Heuff. herb.

δ.) erecta Heuff. herb,

Sect. XVII. Paludosae: Spicae fem. 2—4 breviter pedunculatae, erectae; bracteae amplectentes foliaceae: perigynia oblongo-ovata aut conica, nervosa, in rostrum breve bidentatum bicuspidatum attenuata.

44. C. paludosa Good. in Linn. Trans. II. p. 202. C. acutiformis Ehrh. Calam. n. 30.

β.) Kochiana Cand. Monsp. p. 89.

45. C. riparia Curt. Lond. fasc. IV. T. 60 C. crassa Ehrh calam. n. 59.

46. C. nutans Host Gram I. p. 61. T. 83.

Sect. XVIII. Vesicariae: Spicae fem. 2—4. breviter pedunculatae erectae; bracteae amplectentes foliaceae. perigynia subgloboso-ovata, infata, nervosa rostrum compressum bicuspidatum.

47. C. ampullacea Good in Linn. Trans. II. p. 209. C. vesicaria β.) Linn spec. II. p. 1389. —

48. C. vesicaria Linn. Spec. II. 1388.

Sect. XIX. Pseudo-Cyperi: Spicae masc. subbinae; fem. 4—6. longe pedunculatae, pendulae, bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ovato-lanceolata, nervosa, in rostrum bicuspidatum atteuata; valvae lineari- subulatae.

Digitized by Google

49. C. pseudo-cyperus Linn. Spec. II. p. 1387.

b.) Perigynia hirta.

Sect. XX. Trichocarpae: Spicae fem. 2—3 subsessiles, erectae; bracteae amplectentes foliaceae; perigynia ovata, turgida, in rostrum breve bicuspidatum attenuata.

50. C. filiformis Linn. Spec. II. p. 1358.

Sect. XXI, Hirtae: Spicae fem. 2—3 subsessiles erectae; bracteae vaginantes foliaceae: perigynia plano-convexa in rostrum bicuspidatum acuminata.

51. C. hirta Linn. Spec. II. p. 1389.

II. Carices descisentes; Stigm. 2.

Sect. XXII. Auritae: Spicae fem. 2—3 subsessiles, erectae; bracteae amplectentes vel brevissime vaginantes, basi biauriculatae, foliaceae; perigynia elliptica, plana; rostrum brevissimum teres, oblique truncatum aut leviter emarginatum.

53. C. Goodenovii Gay.

C. caespitosa Good in Lin. Trans. II. p. 195. et omnium fere post cum Auct. Vignea caespitosa Reichenb. excurs. n. 416.

53. C dacica Heuff. herb. C. saxatilis Baumg. Trans. III. p. 296? ecl. Synon.

54. Caespitosa Linn. Spec. II. p, 1388. C. struta Good. in Trans. II. p. 196. et omnium fere post cum Auct. Vignea stricta Reichenb. excurs. n. 415.

55. C. acuta Linn. Spec. II. p, 1388.

A gazdasági s barmászati szak-osztályban részt vett tagok névsora.

Preyer János, városi főbiró.
Niamesny Ignácz, tanácsnok.
Romvalter Theophil, baromorvos.
Feldinger János, vál. polgár.
Karl József, városi hadnagy.
Freund Ferencz k. k. ülnök
Koronghy, polgár-mester.
Popovits Márk, táblabiró.
Popovics János, ügyvéd.
Serbán Demeter, ügyvéd.
Steria Pál, ügyvéd.
Georgevics Mihál, ügyvéd.
Klapka József, táblabiró.
Dunajszky Henrik, rajztanitó.
Karner Vilmos, lelkész.
Rauch Károly, k. k. ülnök.
Wiszkidenszki János, gazdatiszt.
Konyovics Péter, táblai h. jegyző.
Strohmeyer Ferencz, városi Szószóló.
Tullics György, jegyző.
Kőnig Sándor, kereskedő.
Fülep Lopold, ügyvéd,
Szabó Antal, alispán.

Digitized by Google